

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

70-6-33 211166
BULLETIN
TECHNIQUE
DES STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(Tél. 92-97-11 Postes 260 et 263)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DÔME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier,
CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Supplément n° 1 au Bulletin n° 32 de MAI 1963.-

A V E R T I S S E M E N T S . -

A R B R E S F R U I T I E R S

TAVELURE.- (Poiriers - Pommiers). De graves infections sont toujours possibles.

Dans les vergers traités dès réception de notre note du 4 Mai, il y a lieu de renouveler la protection.

CARPOCAPSE.- Les premières éclosions ont été notées dans certains de nos postes d'observations. Toutefois, il est encore trop tôt pour intervenir.

V I G N E

BLACK-ROT.- Dans les Vignes intéressées (là où des dégâts importants ont eu lieu ces dernières années), effectuer un second traitement dès que possible.

VERS DE LA GRAPPE.-

Le début du premier vol vient d'être observé, mais il est encore trop tôt pour intervenir utilement.

I N F O R M A T I O N S . -

A R B R E S F R U I T I E R S

ARAIGNEES ROUGES - PUCERONS - CHENILLES DEFOLIATRICES - OÏDIUM.-

Ne pas négliger la lutte contre ces parasites qui se manifestent en abondance par endroits.

V I G N E

CIGARIER.- Contre cet insecte qui enroule les feuilles en cigare nous rappelons que les produits suivants sont efficaces : D.D.T., H.C.H., LINDANE, PARATHION, ALDRINE, CHLORDANE.

ROT-BRENNER ou ROUGEOT PARASITAIRE.- (Région de THIERS - Puy-de-Dôme et de LAPALISSE - Allier).

Dans les vignobles où cette maladie est à redouter (les feuilles de la base des rameaux et les inflorescences se dessèchent) effectuer un traitement dès que la Vigne présente 3 à 4 feuilles bien étalées (utiliser une bouillie à base de Cuivre, de Zinèbe ou une spécialité à base de Zinèbe + Cuivre).

P.1.7.1

MILDIOU.-

La date d'apparition et l'importance des foyers primaires de Mildiou constituant des indications précieuses au point de vue "Avertissements Agricoles", comme chaque année, une prime de 10 F sera attribuée aux vingt premières personnes qui nous feront parvenir des feuilles attaquées. Les échantillons seront à adresser à la Station, entre 2 feuilles de papier buvard légèrement humectées au départ. Joindre les indications suivantes :

Non, Prénom et adresse de l'expéditeur,
Lieu (bas-fond, coteau...) et date précise de la découverte
Cépage, âge de la vigne et mode de taille
Situation des feuilles attaquées (1ère, 2ème, 3ème feuille...)
Importance de l'attaque.

C O L Z A

CHARANÇON DES SILIQUES.-

Dans la circonscription, ce ravageur n'a pas causé jusqu'alors de graves dégâts.

Si un traitement se justifiait par l'abondance de cet insecte dans certaines cultures, rappelons que, pendant la floraison, seuls les produits suivants reconnus comme non dangereux pour les Abeilles, peuvent être utilisés :

Chlorthiépim, Polychlorocamphanes, Pyréthrinés, Toxaphène.

CECIDOMYIE DES SILIQUES.-

Certaines cultures, par contre, sont fréquemment touchées par la Cécidomyie des Siliques (nombreuses petites larves dans les siliques).

Les traitements (mêmes produits que pour le charançon des siliques) seront limités au pourtour des pièces, sur une largeur de 20 à 30 mètres - Intervenir, s'il y a lieu, à plusieurs reprises pendant la floraison à une dizaine de jours d'intervalle.

Clermont-Ferrand, le 15 Mai 1963.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND

Directeur-Gérant : L. BOUYX